



De Leemkoele 2
7468 DM Enter (Holland)
hollandanimalcare.com



EQUI VITA FORTE

BIJSLUITER • BEIPACKZETTEL • LEAFLET • NOTICE

Aanvullend diervoeder voor paarden.

Voederadvies

50 g per dier per dag. Vermengen met het voer of door het drinkwater (wateroplosbaar).

Sportpaarden:

Bij de opbouw van de training en in periodes waarin verhoogde prestaties worden verwacht gedurende 3-6 weken.

Fokmerries:

In de periode van 3 weken voor de partus tot 3 weken na de dekking.

Dekhengsten:

In te zetten tijdens het gehele dekseizoen ter bevordering van de algehele conditie.

Groei en ontwikkeling:

Gedurende 4-6 weken, met name in de wintermaanden.

Onderhoud:


25 g dagelijks per dier gedurende 7 opeenvolgende dagen. Maandelijks herhalen.

Opmerking:

Voor pony's en veulens het voederadvies halveren.

Samenstelling:

Dextrose, natriumchloride en kaliumchloride.



±25 g

Bewaring:

Koel op een droge plaats. Buiten direct zonlicht. Verpakking afsluiten na elk gebruik.

Ten minste houdbaar tot: zie barcode.

Registratienummer NWWA: 40120.

Geproduceerd volgens HACCP-richtlijnen.

Additifs (par kg):

Nutritionnels:

Zinc (sulphate, monohydrate) -3b605-	2.500 mg
Manganèse (sulphate, monohydrate) -3b503-	1.500 mg
Fer (sulphate, monohydrate) -3b103-	1.500 mg
Cuivre(II) (sulphate, pentahydrate) -3b405-	200 mg
Sélénium (sélénite de sodium) -3b801-	10 mg
Vitamine A -3a672a-	1.000.000 UI
Vitamine D3 -3a671-	50.000 UI
Vitamine E (acétate de tout-rac- α -tocophéryle) -3a700-	5.000 mg
Niacinamide -3a315-	3.000 mg
Calcium-D-pantothénate -3a841-	750 mg
Vitamine B2 -3a825ii-	460 mg
Vitamine K3 -3a711-	285 mg
Vitamine B6 -3a831-	250 mg
Vitamine B9 -3a316-	50 mg
Vitamine B12	25.000 μ g
Biotine -3a880-	11.000 μ g
L-lysine (HCL) -3c322-	450 mg
DL-méthionine -3c301-	1.000 mg

Technologique:

Propionate de calcium -E282-	139.000 mg
Acide citrique -E330-	12.500 mg

Constituants analytiques:

Cendres brutes	18,3 %
Protéines brutes	0,6 %
Mat. grasses brutes	0,1 %
Fibres brutes	0,1 %
Sodium	0,4 %

Aliment complémentaire pour les chevaux.

Instructions d'alimentation:

50 g par animal par jour. Mélanger avec l'alimentation ou ajouter à l'eau potable (soluble dans l'eau).

Chevaux de sport:

Pendant l'accumulation de la formation et dans les périodes où une performance accrue est attendue, pendant 3 à 6 semaines.

Poulinière:

Dans la période de 3 semaines avant la parturition jusqu'à 3 semaines après la reproduction.

Étalons:

Peut être utilisé pendant toute la saison de reproduction pour favoriser l'état général.

Croissance et développement:

Pour 4-6 semaines, surtout en hiver.

Maintien:

25 g par jour par animal pendant 7 jours consécutifs. Répéter mensuellement.


Remarque:

Partagez en deux les instructions d'alimentation pour les poneys et les poulains.

Composition:

Dextrose, chlorure de sodium et chlorure de potassium.

±25 g



Conservation:

Dans un endroit frais et sec. À l'abri des rayons directs du soleil. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

À consommer de préférence avant: voir code-barres.

Numéro d'enregistrement NWWA: 40120.

Produit selon les directives d'HACCP.

Toevoegingsmiddelen (per kg):

Nutritieel:

Zink (sulfaat, monohydraat) -3b605-	2.500 mg
Mangaan (sulfaat, monohydraat) -3b503-	1.500 mg
Ijzer (sulfaat, monohydraat) -3b103-	1.500 mg
Koper(II) (sulfaat, pentahydraat) -3b405-	200 mg
Selenium (natriumseleniet) -3b801-	10 mg
Vitamine A -3a672a-	1.000.000 IE
Vitamine D3 -3a671-	50.000 IE
Vitamine (all-rac- α -tocopherylacetaat) -3a700-	5.000 mg
Niacinamide -3a315-	3.000 mg
Calcium-D-pantothenaat -3a841-	750 mg
Vitamine B2 -3a825ii-	460 mg
Vitamine K3 -3a711-	285 mg
Vitamine B6 -3a831-	250 mg
Vitamine B9 -3a316-	50 mg
Vitamine B12	25.000 µg
Biotine -3a880-	11.000 µg
L-lysine (HCL) -3c322-	450 mg
DL-methionine -3c301-	1.000 mg

Technologisch:

Calciumpropionaat -E282-	139.000 mg
Citroenzuur -E330-	12.500 mg

Analytische bestanddelen:

Ruwe as	18,3 %
Ruw eiwit	0,6 %
Ruw vet	0,1 %
Ruwe celstof	0,1 %
Natrium	0,4 %

Ergänzungsfuttermittel für Pferde.

Fütterungsempfehlung:

50 g pro Tier pro Tag. Mit dem Futter mischen oder durch das Trinkwasser (wasserlöslich).

Sportpferde:

Beim Aufbau des Trainings und in Zeiträumen, in denen eine erhöhte Leistung erwartet wird während 3-6 Wochen.

Zuchstuten:

In der Zeit von 3 Wochen vor der Geburt bis 3 Wochen nach der Deckung.

Zuchthengste:

Während der ganze Zuchtsaison zu verwenden um den Gesamtzustand zu fördern.

Wachstum und Entwicklung:

Für 4-6 Wochen, besonders in den Wintermonaten.

Erhaltung:


25 g täglich pro Tier während 7 aufeinanderfolgende Tage. Monatlich wiederholen.

Anmerkung:

Die Fütterungsempfehlung für Ponys und Fohlen halbieren.

Zusammensetzung:

Dextrose, Natriumchlorid und Kaliumchlorid.



±25 g

Lagerung:

Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung nach jedem Gebrauch schließen.

Mindestens haltbar bis: siehe Barcode.

Registernummer NVWA: 40120.

Produziert nach HACCP-Richtlinien.

Additives (per kg):

Nutritional:

Zinc (sulphate, monohydrate) -3b605-	2,500 mg
Manganese (sulphate, monohydrate) -3b503-	1,500 mg
Iron (sulphate, monohydrate) -3b103-	1,500 mg
Copper(II) (sulphate, pentahydrate) -3b405-	200 mg
Selenium (sodium selenite) -3b801-	10 mg
Vitamin A -3a672a-	1,000,000 IU
Vitamin D3 -3a671-	50,000 IU
Vitamin E (all-rac- α -tocopheryl acetate) -3a700-	5,000 mg
Niacinamide -3a315-	3,000 mg
Calcium-D-pantothenate -3a841-	750 mg
Vitamin B2 -3a825ii-	460 mg
Vitamin K3 -3a711-	285 mg
Vitamin B6 -3a831-	250 mg
Vitamin B9 -3a316-	50 mg
Vitamin B12	25,000 μ g
Biotin -3a880-	11,000 μ g
L-lysine (HCL) -3c322-	450 mg
DL-methionine -3c301-	1,000 mg

Technological:

Calcium propionate -E282-	139,000 mg
Citric acid -E330-	12,500 mg

Analytical constituents:

Crude ash	18.3 %
Crude protein	0.6 %
Crude fat	0.1 %
Crude fibre	0.1 %
Sodium	0.4 %

Complementary feed for horses.

Feed instruction:

50 g per animal per day. Mix with the feed or add to the drinking water (water-soluble).

Sport horses:

During build up of training and in periods where increased performance is expected for 3-6 weeks.

Broodmare:

In the period of 3 weeks before the parturition until 3 weeks after breeding.

Breeding stallion:

Can be used during the entire breeding season to promote overall condition.

Growth and development:

For 4-6 weeks, especially in the winter months.

Maintenance:


25 g daily per animal for 7 consecutive days. Repeat monthly.

Note:

Cut the feed instruction for ponies and foals in half.

Composition:

Dextrose, sodium chloride and potassium chloride.



±25 g

Storage:

Cool and dry. Out of direct sunlight. Reseal packaging after each use.

Best before: see barcode.

Registration number NWWA: 40120.

Produced by HACCP guidelines.

Zusatzstoffe (pro kg):

Ernährungs:

Zink (Sulfat, Monohydrat) -3b605-	2.500 mg
Mangan (Sulfat, Monohydrat) -3b503-	1.500 mg
Eisen (Sulfat, Monohydrat) -3b103-	1.500 mg
Kupfer(II) (Sulfat, Pentahydrat) -3b405-	200 mg
Selen (Natriumselenit) -3b801-	10 mg
Vitamin A -3a672a-	1.000.000 IE
Vitamin D3 -3a671-	50.000 IE
Vitamin E (all-rac- α -Tocopherylacetat) -3a700-	5.000 mg
Niacinamid -3a315-	3.000 mg
Calcium-D-Pantothenat -3a841-	750 mg
Vitamin B2 -3a825ii-	460 mg
Vitamin K3 -3a711-	285 mg
Vitamin B6 -3a831-	250 mg
Vitamin B9 -3a316-	50 mg
Vitamin B12	25.000 μ g
Biotin -3a880-	11.000 μ g
L-Lysin (HCL) -3c322-	450 mg
DL-Methionin -3c301-	1.000 mg

Technologisch:

Calciumpropionat -E282-	139.000 mg
Citronensäure -E330-	12.500 mg

Analytische Bestandteile:

Rohasche	18,3 %
Rohprotein	0,6 %
Rohfett	0,1 %
Rohfaser	0,1 %
Natrium	0,4 %

